

LADY LUCE

LADYANNA x CMK2008-071-009

MEIJER
POTATO



Building on potential

Valeur ajoutée de la variété

Variété adaptée pour le marché premium (chair et forme).
Plante robuste et tolérante aux stress climatiques.
Excellente couleur de frite pendant tout le stockage.
Haut potentiel de rendement dans tous les types de sols.
Tubercules uniformes dans le rendement commercialisable.

Caractéristiques

Forme du tubercule	LO	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	9,2 cm	
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	6,0	
Couleur de la peau	LY	
Couleur de la chair	4,8	
Qualité culinaire	7.9 AB	

Adaptabilité face au type de sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	108	118	111
MS (%)	20,5	21,9	21,6
PSE	375	405	398
Calibre (Ø mm)	52	56	61

Ro1	9	
Ro2/3	6	
Ro5	1	
Pa2	9	
Pa3	8	
wz 1 (D1)	10	
wz 2 (G1)	4	
wz 6 (O1)	5	
wz 18 (T1)	1	
TRV	5	
Virus du Moptop	Tolérante	

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec	Plutôt tolérante
Repousse	7

Besoins en engrais

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Apports - Dose	Faible (-25%)	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Apports - Nombre	1	1	1	6	1	1	1

Protection phytosanitaire

Mildiou du feuillage	3
Mildiou du tubercule	Plutôt sensible
Alternaria	Tolérante
Virus-Y	7
Virus-Yntn	8
Virus de l'enroulement	Tolérante
Dartrose	Tolérante
Gale argentée	Tolérante
Métribuzine en pré-levée	Tolérante
Métribuzine en post-levée	Tolérante

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	7,0
Points de compression	Plutôt tolérante
Fusariose	6
Fritabilité/chipabilité en octobre*	7,7
Fritabilité/chipabilité en février*	7,8
Fritabilité/chipabilité en mai*	7,6

*Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de germination

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0-50)	16
Lavabilité	6
Gale commune	6
Gale poudreuse	7
% Tâches de rouille	5
% Cœurs creux	1
Chocs de type fracture	



Plantation


Eviter les sols sujets au virus du rattle du tabac (TRV).
Attendre le "stade points blancs" avant de planter.
Planter à une profondeur normale.

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	36 cm	30 cm	37000
35/50	41 cm	34 cm	32500
50/60	48 cm	40 cm	27800
50/60 CUT	39 cm	33 cm	34200



Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.



Azote:	(N)	200	200
Phosphate:	(P ₂ O ₅)	110	110
Potasse:	(K ₂ O)	300	300

Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

Ne pas utiliser de chlorure potasse afin d'éviter le risque de grisaillement des frites.
Réduire les apports azotés de 25% par rapport aux variétés de référence; le tout avant/à la plantation.



Protection des cultures

Variété sensible au mildiou du feuillage, ne pas négliger la protection fongicide.
Démarrer le contrôle anti-mildiou à temps.



Récolte et stockage

Après l'arrachage, sécher les pommes de terre par ventilation.

Stockage:
7 °C
9 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Eviter les sols sujets au virus du rattle du tabac (TRV).
Ne pas utiliser de chlorure potasse afin d'éviter le risque de grisaillement des frites.
Réduire les apports azotés de 25% par rapport aux variétés de référence; le tout avant/à la plantation.

