

LADY ROSETTA

CARDINAL x (VTN)262-33-3



Building on potential

Mehrwert von Sorte

Die früheste Chips-Sorte auf dem Markt.
Kann direkt ab Feld geerntet werden.
Sorte mit hohem Trockensubstanzgehalt.
Guter Ertrag in der Früh- und Haupternte.

Eigenschaften:

Knollenform	R	
Knollenlänge Ø (50-60 mm)	6,5 cm	
Reifezeit (9=früh, 4=spät)	6,7	
Schalenfarbe	DR	
Fleischfarbe	6,3	
Speisequalität		

A B C D

Bodenanpassungsfähigkeit

	Sandig	leicht	Schwer
Ertrag (relativ)	70	87	77
DM (%)	24,1	24,7	24,8
UWG	449	460	463
Knollen Ø (mm)	51	60	62

Ro1	9	
Ro2/3		
Ro5		
Pa2	2	
Pa3	2	
wz 1 (D1)	9	
wz 2 (G1)		
wz 6 (O1)	7	
wz 18 (T1)		
TRV	8	
Moptop-Virus	Anfällig	

Klimaanpassungsfähigkeit

Trockenheitstoleranz	Ziemlich tolerant
Durchwuchs	7

Düngemittelbedarf

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Dosis	Standard	Standard	Hoch (+25%)	Standard	Standard	Standard	Standard
Dosierungen #	1	1	1	6	1	1	1

Pflanzenschutz

Krautfäule	3
Knolle Krautfäule	Anfällig
Alternaria Knollenfäule	Tolerant
Y-Virus	8
Yntn-virus	7
Blattrollenvirus	Ziemlich tolerant
Schwarzer Punkt	Ziemlich tolerant
Silberschorf	Anfällig
Metribuzin Voraufbau	Tolerant
Metribuzin nach dem Auflaufen	Tolerant

Lagerfähigkeit

Keimruhe* (2 = kurz; 8 = lang)	4,2
Druckpunkte	
Fusarium	7
Verarbeitungsfarbe im Oktober*	6,6
Verarbeitungsfarbe im Februar*	5,6
Verarbeitungsfarbe im Mai*	4,2

*Kartoffeln bei 8°C gelagert ohne Keimhemmungsmittel

Marktgängiger Ertrag

Blau/Schwarzfleckigkeit index (0-50)	38
Waschfähigkeit	5
Schorf	7
Puderschorf	8
% IRS	2
% HH	1
Äußere Beschädigungen	Anfällig

LADY ROSETTA



Pflanzen


Vorgekeimtes Pflanzgut, zehn Tage früher rodefähig.
Gegen Rhizoctonia / Silberschorf behandeln.

Sortierung	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	19 cm	16 cm	70200
35/50	27 cm	23 cm	49400
50/60	39 cm	33 cm	34200
35/55	29 cm	24 cm	46000
55/60	40 cm	33 cm	33300
60 +	41 cm	34 cm	32500



Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

Abhängig vom Bodenvorrat, und der nationalen Gesetzgebung.



Stickstoff (N)	220	220
Phosphat (P2O5)	110	110
Kali (K2O)	230	330

Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen (B, Mg, Mn, Ca)

Kali kurz vor dem Pflanzen und während des Wachstums verwenden.
Wir empfehlen Extra Kali (K) für besseren Qualität.




Ernteschutz

Bei anfällige Krautfäule Sorte, vernachlässigen Sie nicht Krautfäule Bekämpfung.
Rechtzeitig anfangen mit Krautfäulebekämpfung.



Ernte und Lagerung

Vorsichtig roden, blauempfindlich.
Nach dem Roden sofort trocken belüften.
Sorte nicht für Langzeitlagerung geeignet.

**Lagerung:**
8 °C
4 Monate

Wichtige Ratschläge für den Erfolg dieser Sorte:

Kali kurz vor dem Pflanzen und während des Wachstums verwenden.
Wir empfehlen Extra Kali (K) für besseren Qualität.
Bei anfällige Krautfäule Sorte, vernachlässigen Sie nicht Krautfäule Bekämpfung.
Vorsichtig roden, blauempfindlich.

Ernte unter
guten Bedingungen
um Blauverfärbung
zu vermeiden

