

MUSICA

CMK1993-042-005 x LADYCHRISTL



Building on potential

Mehrwert von Sorte

Exzellente Geschmack, Textur und Kochqualität.
Guter Ertrag bei Frührodung.
Tolerant gegenüber klimatischem Stress.
Sorte geeignet für Früh- und Hauptkulturanbau.

Eigenschaften:

Knollenform	LO	
Knollenlänge Ø (50-60 mm)	8,8 cm	
Reifezeit (9=früh, 4=spät)	6,9	
Schalenfarbe	DY	
Fleischfarbe	7,7	
Speisequalität	8 A	

Bodenanpassungsfähigkeit

	Sandig	leicht	Schwer
Ertrag (relativ)	108	115	105
DM (%)	18,1	19,6	19,6
UWG	328	358	359
Knollen Ø (mm)	50	54	57

Ro1	9	
Ro2/3	8	
Ro5	9	
Pa2	6	
Pa3	3	
wz 1 (D1)	10	
wz 2 (G1)	4	
wz 6 (O1)	4	
wz 18 (T1)	4	
TRV		
Moptop-Virus	Tolerant	

Klimaanpassungsfähigkeit

Trockenheitstoleranz	Ziemlich tolerant
Durchwuchs	7

Düngemittelbedarf

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Dosis	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Dosierungen #	2	1	1	6	1	1	1

Pflanzenschutz

Krautfäule	3
Knolle Krautfäule	ziemlich anfällig
Alternaria Knollenfäule	Ziemlich tolerant
Y-Virus	8
Yntn-virus	10
Blattrollenvirus	ziemlich anfällig
Schwarzer Punkt	ziemlich anfällig
Silberschorf	ziemlich anfällig
Metribuzin Voraufbau	Tolerant
Metribuzin nach dem Auflaufen	Tolerant

Lagerfähigkeit

Keimruhe* (2 = kurz; 8 = lang)	1,7
Druckpunkte	
Fusarium	8
Verarbeitungsfarbe im Oktober*	4,0
Verarbeitungsfarbe im Februar*	3,3
Verarbeitungsfarbe im Mai*	3,0

*Kartoffeln bei 8°C gelagert ohne Keimhemmungsmittel

Marktgängiger Ertrag

Blau/Schwarzfleckigkeit index (0-50)	14
Waschfähigkeit	6
Schorf	7
Puderschorf	
% IRS	4
% HH	0
Äußere Beschädigungen	Ziemlich tolerant



Pflanzen


Allein vorkeimen mit vorkeimsystem Joppe oder Vorkeimkisten.
Gegen Rhizoctonia / Silberschorf behandeln.
Frühe Knollenwachstum.

Sortierung	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	20 cm	17 cm	66700
35/55	30 cm	25 cm	44400
55/60	37 cm	31 cm	36000



Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

Abhängig vom Bodenvorrat, und der nationalen Gesetzgebung.



Stickstoff (N)	200	225
Phosphat (P2O5)	110	110
Kali (K2O)	300	300

Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen (B, Mg, Mn, Ca)



Ernteschutz

Bei anfällige Krautfäule Sorte, vernachlässigen Sie nicht Krautfäule Bekämpfung.



Ernte und Lagerung

Für eine hübsche, glatte Schale und gute Knollenform, den Bestand zeitig abtöten.
Natürliche Weise absterben gibt hohe Erträge, aber eine geringere Schalequalität.

Lagerung:
4 °C
6 Monate

Wichtige Ratschläge für den Erfolg dieser Sorte:

Allein vorkeimen mit vorkeimsystem Joppe oder Vorkeimkisten.
Frühe Knollenwachstum.
Für eine hübsche, glatte Schale und gute Knollenform, den Bestand zeitig abtöten.

