

JAZZY (0-40 mm)

Beddenteelt

FRANCELINE x CUPIDO



Building on potential

Toegevoegde waarde van het ras

Excellente smaak, textuur en kookkwaliteit.
Erg mooie schilkkwaliteit.
Ras met een erg hoog knolaantal.
Ras geschikt voor het salade segment.
Weinig gevoelig voor schurft.



Eigenschappen

Knolvorm	LO	
Gem. knollengte (Ø 50-60 mm)	9,0 cm	
Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)	7,7	
Schilkleur	Y	
Vleeskleur	7,0	
Kookkwaliteit en kooktype	8 A	

Geschiktheid voor alle grondsoorten

	Zand	Licht	Zwaar
Opbrengst (%)	55	63	65
Droge stof (%)	17,1	19,1	19,3
OWG	308	348	351
Knol (Ø mm)	35	36	39

Ro1	3	●
Ro2/3		○
Ro5		○
Pa2		○
Pa3		○
wz 1 (D1)	10	●
wz 2 (G1)	4	●
wz 6 (O1)	4	●
wz 18 (T1)	6	●
TRV	7	●
Moptop virus	Tolerant	

Klimaat adaptiviteit

Droogte tolerantie	Gevoelig
Doorwas	7 ●

Bemesting

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Hoogte van de gift	Standaard	Hoog (+25%)	Laag (-25%)	Hoog (+25%)	Standaard	Standaard	Standaard
Aantal giften	1	1	1	4	1	1	1

Gewasbescherming

Phytophthora loof	3 ●
Phytophthora knol	Gevoelig
Alternaria	Redelijk gevoelig
Y-virus	6 ●
Yntn-virus	7 ●
Bladrol virus	Tolerant
Zwarte spikkel	Tolerant
Zilvereschurft	Tolerant
Metribuzin voor opkomst	Tolerant
Metribuzin na opkomst	Gevoelig

Bewaarbaarheid

Kiemrust (2=kort, 8=lang)	2,1	
Drukplekken	Redelijk gevoelig	
Fusarium	4 ●	
Bakkleur in oktober*	4,1 ●	
Bakkleur in februari*	3,2 ●	
Bakkleur in mei*	3,3 ●	

* Aardappels bewaard op 8°C

Vermarktbaar opbrengst

Blauw index (0-50)	4 ●
Wasbaarheid	8 ●
Schurft	7 ●
Poederschurft	6 ●
Interne gebreken	0,2 ●
Hol	0,0 ●
Beschadigingen	Redelijk tolerant

JAZZY (0-40 mm)



Planten

Pootgoed niet los laten komen, direct uit de koeling planten.

Plantdiepte ca 12cm in de beddenteelt.

Nauwere plantafstand geeft meer knollen per ha.


Genoeg vocht op het moment van knolzetting geeft meer knollen per ha.

Maat	150 cm	180 cm	Plant/ha
25/30	18 cm	15 cm	111000
30/40	22 cm	18 cm	91000
40/50	26 cm	22 cm	77000
50/55	31 cm	26 cm	65000



Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



Stikstof:	(N)	150
Fosfaat:	(P ₂ O ₅)	160
Kali:	(K ₂ O)	250

Totaal
150
160
250

Om gebrek aan sporenelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, Ca).

Voor meer tal wordt Fosfaat in de rij aanbevolen.



Gewasbescherming

Gevoelig voor 150 g/ha Metribuzin na opkomst.

Gevoelig voor Phytophthora in het loof, wees alert.

Snelle knolgroei aan het eind van het seizoen, op tijd dood maken.



Oogst en opslag

Oogst zodra de aardappel velvast is, ca 18 dgn na loofdoding.

Korte kiemrust: na wondheling snel terug koelen en

de temperatuur stabiel houden en starten met kiemremming.

Start met kiemremming zodra de aardappelen droog zijn.



Bewaring:

2 °C

6 maanden

Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

Pootgoed niet los laten komen, direct uit de koeling planten.

Nauwere plantafstand geeft meer knollen per ha.

Voor meer tal wordt Fosfaat in de rij aanbevolen.

Oogst zodra de aardappel velvast is, ca 18 dgn na loofdoding.

Houd de
bewaar-
temperatuur
stabiel

