

# LADY FORTE

CMK2005-210-007 x LADYANNA



Building on potential

## Toegevoegde waarde van het ras

- Uniforme sortering in de maat.
- Robuuste plant, tolerant voor klimaat stress.
- Goede bakkleur gedurende de bewaarperiode.
- Hoge opbrengst op alle grondsoorten.
- Lange kiemrust, geschikt voor lange bewaring.

## Eigenschappen

Knolvorm	LO	
Gem. knollengte (Ø 50-60 mm)	9,0 cm	
Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)	6,1	
Schilkleur	Y	
Vleeskleur	6,8	
Kookkwaliteit en kooktype	8 B	

## Geschiktheid voor alle grondsoorten

	Zand	Licht	Zwaar
Opbrengst (%)	111	104	117
Droge stof (%)	22,0	22,5	22,6
OWG	407	417	419
Knol (Ø mm)	53	58	62

Ro1	9	
Ro2/3	6	
Ro5	3	
Pa2	7	
Pa3	1	
wz 1 (D1)	4	
wz 2 (G1)		
wz 6 (O1)	3	
wz 18 (T1)	5	
TRV	6	
Moptop virus	Tolerant	

## Klimaat adaptiviteit

Droogte tolerantie	Redelijk tolerant
Doorwas	7

## Bemesting

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Hoogte van de gif	-10%	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Aantal giften	2	1	1	6	1	1	1

## Gewasbescherming

Phytophthora loof	3
Phytophthora knol	Redelijk gevoelig
Alternaria	Tolerant
Y-virus	8
Yntn-virus	10
Bladrol virus	Redelijk tolerant
Zwarte spikkel	Redelijk tolerant
Zilverschorft	Redelijk tolerant
Metribuzin voor opkomst	Tolerant
Metribuzin na opkomst	Tolerant

## Bewaarbaarheid

Kiemrust* (2=kort, 8=lang)	7,7
Drukplekken	Redelijk tolerant
Fusarium	7
Bakkleur in oktober*	6,5
Bakkleur in februari*	6,1
Bakkleur in mei*	6,2

\* Aardappels bewaard op 8°C zonder kiemremmingsmiddel

## Vermarktbaarheid

Blauw index (0-50)	9
Wasbaarheid	6
Schorft	7
Poederschorft	5
% Interne gebreken	2
% Hol	1
Beschadigingen	Redelijk tolerant

# LADY FORTE

MEIJER  
POTATO 



## Planten

Lijkt gevoelig voor poederschurft, kies de juiste grond.

Pootgoed goed los laten komen voor het planten.


Plant op normale diepte.

Maat	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	33 cm	28 cm	40400
35/50	41 cm	34 cm	32500
50/60	44 cm	37 cm	30300
50/60 CUT	35 cm	29 cm	38100



## Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



Stikstof:	(N)	200	50	250
Fosfaat:	(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	110		110
Kali:	(K <sub>2</sub> O)	300		300

Om gebrek aan sporenelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, Ca).

Teveel stikstof heeft een negatief effect op de opbrengst.



## Gewasbescherming

Gevoelig voor Phytophthora in het loof, wees alert.


Tijdig beginnen met Phytophthora bestrijding.



## Oogst en opslag

Na rooien zo snel mogelijk drogen.

Ethyleen in de bewaring kan de bakkwaliteit van dit ras beïnvloeden.



### Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

- Pootgoed goed los laten komen voor het planten.
- Lijkt gevoelig voor poederschurft, kies de juiste grond.
- Gevoelig voor Phytophthora in het loof, wees alert.
- Na rooien zo snel mogelijk drogen.

