

LADY LUCE

LADYANNA x CMK2008-071-009

MEIJER
POTATO



Building on potential

Toegevoegde waarde van het ras

Witvlezig en lange knollen geschikt voor het hogere segment.
Robuuste plant, tolerant voor klimaat stress.
Excellente bakkleur gedurende de bewaarperiode.
Hoge opbrengst op alle grondsoorten.
Uniforme sortering in de maat.

Eigenschappen

Knolvorm	LO	
Gem. knollengte (Ø 50-60 mm)	9,2 cm	
Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)	6,0	
Schilkleur	LY	
Vleeskleur	4,8	
Kookkwaliteit en kooktype	7.9 AB	

Geschiktheid voor alle grondsoorten

	Zand	Licht	Zwaar
Opbrengst (%)	108	118	111
Droge stof (%)	20,5	21,9	21,6
OWG	375	405	398
Knol (Ø mm)	52	56	61

Ro1	9	
Ro2/3	6	
Ro5	1	
Pa2	9	
Pa3	8	
wz 1 (D1)	10	
wz 2 (G1)	4	
wz 6 (O1)	5	
wz 18 (T1)	1	
TRV	5	
Moptop virus	Tolerant	

Klimaat adaptiviteit

Droogte tolerantie	Redelijk tolerant
Doorwas	7

Bemesting

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Hoogte van de gif	Laag (-25%)	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Aantal giften	1	1	1	6	1	1	1

Gewasbescherming

Phytophthora loof	3
Phytophthora knol	Redelijk gevoelig
Alternaria	Tolerant
Y-virus	7
Yntn-virus	8
Bladrol virus	Tolerant
Zwarte spikkel	Tolerant
Zilverschorft	Tolerant
Metribuzin voor opkomst	Tolerant
Metribuzin na opkomst	Tolerant

Bewaarbaarheid

Kiemrust* (2=kort, 8=lang)	7,0
Drukplekken	Redelijk tolerant
Fusarium	6
Bakkleur in oktober*	7,7
Bakkleur in februari*	7,8
Bakkleur in mei*	7,6

* Aardappels bewaard op 8°C zonder kiemremmingsmiddel

Vermarktbaar opbrengst

Blauw index (0-50)	16
Wasbaarheid	6
Schorft	6
Poederschorft	7
% Interne gebreken	5
% Hol	1
Beschadigingen	

LADY LUCE



Planten


Vermijd percelen met een risico op TRV.
Pootgoed goed los laten komen voor het planten.
Plant op normale diepte.

Maat	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	36 cm	30 cm	37000
35/50	41 cm	34 cm	32500
50/60	48 cm	40 cm	27800
50/60 CUT	39 cm	33 cm	34200



Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



Stikstof:	(N)	200	200
Fosfaat:	(P ₂ O ₅)	110	110
Kali:	(K ₂ O)	300	300

Om gebrek aan sporenelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, Ca).

Geen chloorkali gebruiken om grauwerkleuring van friet te voorkomen.
Geef 25% minder stikstof dan een referentieras en geef alles aan de basis, rondom planten.




Gewasbescherming

Gevoelig voor Phytophthora in het loof, wees alert.
Tijdig beginnen met Phytophthora bestrijding.



Oogst en opslag

Na rooien zo snel mogelijk drogen.

**Bewaring:**
7 °C
9 maanden

Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

Vermijd percelen met een risico op TRV.
Geen chloorkali gebruiken om grauwerkleuring van friet te voorkomen.
Geef 25% minder stikstof dan een referentieras en geef alles aan de basis, rondom planten.

