

# SOPRANO

SPUNTA x CMK1990-002-002



Building on potential

## Toegevoegde waarde van het ras

Geschikt voor frites en tafelaardappel.  
Uniforme sortering in de maat.  
Excellente smaak, textuur en kookkwaliteit.  
Wasbare en mooie schil.

**MEIJER**  
POTATO

## Eigenschappen

Knolvorm	LO	
Gem. knollengte (Ø 50-60 mm)	9,0 cm	
Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)	7,3	
Schilkleur	Y	
Vleeskleur	6,6	
Kookkwaliteit en kooktype	8 AB	

## Geschiktheid voor alle grondsoorten

	Zand	Licht	Zwaar
Opbrengst (%)	95	90	85
Droge stof (%)	17,2	19,8	19,9
OWG	309	361	365
Knol (Ø mm)	51	54	56

Ro1	2	
Ro2/3		
Ro5		
Pa2		
Pa3		
wz 1 (D1)	8	
wz 2 (G1)		
wz 6 (O1)	6	
wz 18 (T1)		
TRV		
Moptop virus	Tolerant	

## Klimaat adaptiviteit

Droogte tolerantie	Gevoelig
Doorwas	7

## Bemesting

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Hoogte van de gif	Standaard	Standaard	Standaard	Hoog (+25%)	Standaard	Standaard	Standaard
Aantal giften	1	1	1	6	1	1	1

## Gewasbescherming

Phytophthora loof	3
Phytophthora knol	Redelijk gevoelig
Alternaria	Redelijk tolerant
Y-virus	6
Yntn-virus	7
Bladrol virus	Gevoelig
Zwarte spikkel	Gevoelig
Zilverscurft	Redelijk tolerant
Metribuzin voor opkomst	Tolerant
Metribuzin na opkomst	Tolerant

## Bewaarbaarheid

Kiemrust* (2=kort, 8=lang)	4,1
Drukplekken	Redelijk gevoelig
Fusarium	7
Bakkleur in oktober*	6,8
Bakkleur in februari*	5,5
Bakkleur in mei*	5,7

\* Aardappels bewaard op 8°C zonder kiemremmingsmiddel

## Vermarktbaarheid

Blauw index (0-50)	10
Wasbaarheid	7
Scurft	6
Poederscurft	
% Interne gebreken	0
% Hol	0
Beschadigingen	Redelijk tolerant



## Planten


Pootgoed niet los laten komen, direct uit de koeling planten.  
 Pootgoed niet afkiemen.  
 Niet telen op schurft gevoelige gronden.  
 Alleen op beregende percelen.

Maat	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	30 cm	25 cm	44400
35/45	34 cm	28 cm	39200
45/55	41 cm	34 cm	32500
35/55	40 cm	33 cm	33300
55/60	43 cm	36 cm	31000
60 +	44 cm	37 cm	30300



## Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



Stikstof:	(N)	200	50	250
Fosfaat:	(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	110		110
Kali:	(K <sub>2</sub> O)	300		300

*Om gebrek aan sporenelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, Ca).*



## Gewasbescherming

Gevoelig voor Phytophthora in het loof, wees alert.  
 Beregening heeft een positief effect op de knolzetting en schilkwaliteit.



## Oogst en opslag

Stop beregening voor loofdding zodat huidmondjes sluiten.  
 De knolgroei vindt plaats totdat het gewas volledig op z'n retour gaat.  
 Na rooien zo snel mogelijk drogen.  
 Korte kiemrust: na wondheling snel terug koelen,  
 de temperatuur stabiel houden en starten met kiemremming.

**Bewaring:**  
 4 °C  
 6 maanden

### Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

Pootgoed niet los laten komen, direct uit de koeling planten.  
 Pootgoed niet afkiemen.  
 Niet telen op schurft gevoelige gronden.  
 Stop beregening voor loofdding zodat huidmondjes sluiten.

Vermijd  
 kiemen  
 voor  
 het planten

