

SOUND

MONDIAL x CMK2003-707-003



Building on potential





Toegevoegde waarde van het ras

- Erg bruikbaar voor thuisfriet.
- Erg mooie schilkwaliteit.
- Hoge opbrengst op alle grondsoorten.
- Droogte resistent ras.

MEIJER 
POTATO



Eigenschappen


Knolvorm	LO	
Gem. knollengte (Ø 50-60 mm)	9,1 cm	
Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)	6,5	
Schilkleur	LY	
Vleeskleur	7,0	
Kookkwaliteit en kooktype	7,4 B	

Geschiktheid voor alle grondsoorten

	Zand	Licht	Zwaar
Opbrengst (%)	118	128	121
Droge stof (%)	18,6	20,3	20,7
OWG	338	373	380
Knol (Ø mm)	52	58	61

Ro1	9	
Ro2/3	4	
Ro5	8	
Pa2	3	
Pa3	2	
wz 1 (D1)	9	
wz 2 (G1)		
wz 6 (O1)	4	
wz 18 (T1)	4	
TRV	6	
Moptop virus	Redelijk gevoelig	




Klimaat adaptiviteit

Droogte tolerantie	Redelijk tolerant
Doorwas	7 






Bemesting

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Hoogte van de gif	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Aantal giften	1	1	1	6	1	1	1

Gewasbescherming







Phytophthora loof	9 
Phytophthora knol	Redelijk gevoelig
Alternaria	Tolerant
Y-virus	
Yntn-virus	7 
Bladrol virus	
Zwarte spikkel	Redelijk tolerant
Zilverscurft	Tolerant
Metribuzin voor opkomst	Gevoelig
Metribuzin na opkomst	Tolerant

Bewaarbaarheid

Kiemrust* (2=kort, 8=lang)	7,1 
Drukplekken	Redelijk tolerant
Fusarium	6 
Bakkleur in oktober*	6,3 
Bakkleur in februari*	5,8 
Bakkleur in mei*	6,3 

* Aardappels bewaard op 8°C zonder kiemremmingsmiddel

Vermarktbaarheid

Blauw index (0-50)	22 
Wasbaarheid	7 
Scurft	6 
Poederscurft	6 
% Interne gebreken	1 
% Hol	0 
Beschadigingen	Redelijk gevoelig



Planten


Niet telen op schurft gevoelige gronden.
 Bewaar het pootgoed niet in Talent: negatief effect op kieming.
 Plant op normale diepte.
 Teveel beregening kan leiden tot een lagere vermarktbare opbrengst.

Maat	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	29 cm	24 cm	46800
35/45	35 cm	29 cm	38100
35/55	38 cm	32 cm	35100
45/55	39 cm	33 cm	34200
55/60	42 cm	35 cm	31700
60 +	43 cm	36 cm	31000



Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



Stikstof:	(N)	200	200
Fosfaat:	(P ₂ O ₅)	110	110
Kali:	(K ₂ O)	350	350

Om gebrek aan sporenelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, Ca).

Gebruik geen Chloorkali om te laag onderwatergewicht te voorkomen.



Gewasbescherming

Gevoelig voor de volle dosering Metribuzin voor opkomst.
 Phytophthora bespuitingen als praktijk, met een volle dosering en een normaal interval.



Oogst en opslag

Goed laten afharden voor het rooien.
 Pas op voor rooibeschatiging.
 Start met kiemremming zodra de aardappelen droog zijn.



Bewaring:

7 °C
 8 maanden

Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

Teveel beregening kan leiden tot een lagere vermarktbare opbrengst.
 Gebruik geen Chloorkali om te laag onderwatergewicht te voorkomen.

Beregen
 niet te veel
 voor goede
 kwaliteit

