

LADY AMARILLA

AGRIA x HERMES



Building on potential

Mehrwert von Sorte

Exzellente Backfarbe während der gesamten Lagerzeit.
Gleichmäßige Knollengröße in hohen marktfähigen Erträgen.
Sorte mit geringem Blauempfindlichkeit.
Lange Keimruhe für lange Lagerung geeignet.



Eigenschaften:

Knollenform	LO	
Knollenlänge Ø (50-60 mm)	8,4 cm	
Reifezeit (9=früh, 4=spät)	7,3	
Schalenfarbe	DY	
Fleischfarbe	7,1	
Speisequalität	7,6 AB	

Bodenanpassungsfähigkeit

	Sandig	Leicht	Schwer
Ertrag (relativ)	78	80	66
DM (%)	20,6	22,0	21,4
UWG	378	406	394
Knollen Ø (mm)	47	55	57

Ro1	1	
Ro2/3	1	
Ro5		
Pa2	1	
Pa3	1	
wz 1 (D1)	10	
wz 2 (G1)	4	
wz 6 (O1)	4	
wz 18 (T1)	4	
TRV	8	
Moptop-Virus	Tolerant	

Klimaanpassungsfähigkeit

Trockenheitstoleranz	Anfällig
Durchwuchs	7

Düngemittelbedarf

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Dosis	Hoch (+25%)	Standard	Standard	Hoch (+25%)	Standard	Standard	Hoch (+25%)
Dosierungen #	3	1	1	8	1	1	6

Pflanzenschutz

Krautfäule	4
Knolle Krautfäule	ziemlich anfällig
Alternaria Knollenfäule	ziemlich anfällig
Y-Virus	8
Yntn-virus	7
Blattrollenvirus	
Schwarzer Punkt	Ziemlich tolerant
Silberschorf	Ziemlich tolerant
Metribuzin Vorauflauf	Tolerant
Metribuzin nach dem Auflaufen	Tolerant

Lagerfähigkeit

Keimruhe* (2 = kurz; 8 = lang)	7,8
Druckpunkte	Ziemlich tolerant
Fusarium	5
Verarbeitungsfarbe im Oktober*	7,9
Verarbeitungsfarbe im Februar*	8,0
verarbeitungsfarbe im Mai*	7,9

*Kartoffeln bei 8°C gelagert ohne Keimhemmungsmittel

Marktgängiger Ertrag

Blau/Schwarzfleckigkeit index (0-50)	2
Waschfähigkeit	6
Schorf	7
Puderschorf	7
% IRS	0
% HH	0
Äußere Beschädigungen	Ziemlich tolerant

LADY AMARILLA



Pflanzen


- Nicht zu früh pflanzen im kalten Boden (> 8° C).
- Pflanzgut keimgestimmt pflanzen.
- Pflanzkartoffeln nicht abkeimen.
- Nicht anbauen auf Schwere Böden.
- Geeignet für Mineralböden.

Sortierung	75 cm	90 cm	Plant/ha
30/40	33 cm	28 cm	40400
40/50	38 cm	32 cm	35100
35/55	35 cm	29 cm	38100
50/60	39 cm	33 cm	34200



Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

Abhängig vom Bodenvorrat, und der nationalen Gesetzgebung.



Stickstoff (N)	200	50	25	--	275
Phosphat (P2O5)	110				110
Kali (K2O)	300				300

Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen (B, Mg, Mn, Ca)

Stickstoff Spaltung ist notwendig, um gute Erträge zu gewährleisten.
Verwenden Sie kein Kaliumchlorid sonst gibt es Risiko auf Grauverfärbung.



Ernteschutz

Bei anfällige Krautfäule Sorte, vernachlässigen Sie nicht Krautfäule Bekämpfung.
Schützen Sie die Pflanzen bei hohem Blattlausdruck.



Ernte und Lagerung

Mutterknolle muss ganz verschwunden sein vor der Ernte.
Nach dem Roden sofort trocken belüften.



Lagerung:

6 °C
9 Monate

Wichtige Ratschläge für den Erfolg dieser Sorte:

- Nicht zu früh pflanzen im kalten Boden (> 8° C).
- Pflanzgut keimgestimmt pflanzen.
- Verwenden Sie kein Kaliumchlorid sonst gibt es Risiko auf Grauverfärbung.
- Stickstoff Spaltung ist notwendig, um gute Erträge zu gewährleisten.
- Mutterknolle muss ganz verschwunden sein vor der Ernte.

Vermeiden Sie
Abkeimen
vor
Pflanzen

