

# SOPRANO

SPUNTA x CMK1990-002-002



Building on potential

## Mehrwert von Sorte

Geeignet als Pommes-Frites- und Speisesorte.  
Gleichmäßige Knollengröße in hohen marktfähigen Erträgen.  
Exzellente Geschmack, Textur und Kochqualität.  
Waschbare und attraktive Schale.

**MEIJER**   
**POTATO**



## Eigenschaften:

Knollenform	LO	
Knollenlänge Ø (50-60 mm)	9,0 cm	
Reifezeit (9=früh, 4=spät)	7,3	
Schalensfarbe	Y	
Fleischfarbe	6,6	
Speisequalität	8 AB	

A B C D

## Bodenanpassungsfähigkeit

	Sandig	Leicht	Schwer
Ertrag (relativ)	95	90	85
DM (%)	17,2	19,8	19,9
UWG	309	361	365
Knollen Ø (mm)	51	54	56

Ro1	2	<input type="radio"/>
Ro2/3		<input type="radio"/>
Ro5		<input type="radio"/>
Pa2		<input type="radio"/>
Pa3		<input type="radio"/>
wz 1 (D1)	8	<input checked="" type="radio"/>
wz 2 (G1)		<input type="radio"/>
wz 6 (O1)	6	<input type="radio"/>
wz 18 (T1)		<input type="radio"/>
TRV		<input type="radio"/>
Moptop-Virus	Tolerant	

## Klimaanpassungsfähigkeit

Trockenheitstoleranz	Anfällig
Durchwuchs	7 <input checked="" type="radio"/>

## Düngemittelbedarf

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Dosis	Standard	Standard	Standard	Hoch (+25%)	Standard	Standard	Standard
Dosierungen #	1	1	1	6	1	1	1

## Pflanzenschutz

Krautfäule	3	<input type="radio"/>
Knolle Krautfäule	ziemlich anfällig	
Alternaria Knollenfäule	Ziemlich tolerant	
Y-Virus	6	<input type="radio"/>
Yntn-virus	7	<input checked="" type="radio"/>
Blattrollenvirus		
Schwarzer Punkt	Anfällig	
Silberschorf	Ziemlich tolerant	
Metribuzin Vorauflauf	Tolerant	
Metribuzin nach dem Auflaufen	Tolerant	

## Lagerfähigkeit

Keimruhe* (2 = kurz; 8 = lang)	4,1	
Druckpunkte	ziemlich anfällig	
Fusarium	7	<input checked="" type="radio"/>
Verarbeitungsfarbe im Oktober*	6,8	<input type="radio"/>
Verarbeitungsfarbe im Februar*	5,5	<input type="radio"/>
verarbeitungsfarbe im Mai*	5,7	<input type="radio"/>

\*Kartoffeln bei 8°C gelagert ohne Keimhemmungsmittel

## Marktgängiger Ertrag

Blau/Schwarzfleckigkeit index (0-50)	10	<input checked="" type="radio"/>
Waschfähigkeit	7	<input type="radio"/>
Schorf	6	<input type="radio"/>
Puderschorf		<input type="radio"/>
% IRS	0	<input checked="" type="radio"/>
% HH	0	<input checked="" type="radio"/>
Äußere Beschädigungen	Ziemlich tolerant	



## Pflanzen

Pflanzgut vor Pflanzen ruhig halten und pflanzen Sie gleich aus Lager.

Pflanzkartoffeln nicht abkeimen.

Nicht anbauen auf Schorf anfälligen Boden.


Nur auf berechneten Parzellen anbauen.

Sortierung	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	30 cm	25 cm	44400
35/45	34 cm	28 cm	39200
45/55	41 cm	34 cm	32500
35/55	40 cm	33 cm	33300
55/60	43 cm	36 cm	31000
60 +	44 cm	37 cm	30300



## Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

Abhängig vom Bodenvorrat, und der nationalen Gesetzgebung.



Stickstoff (N)	200	50	250
Phosphat (P2O5)	110		110
Kali (K2O)	300		300

Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen ( B, Mg, Mn, Ca )



## Ernteschutz

Bei anfällige Krautfäule Sorte, vernachlässigen Sie nicht Krautfäule Bekämpfung.

Bewässerung erhöht Knollansatz und gibt besseren Schale Qualität.



## Ernte und Lagerung

Rechtzeitig Bewässerung aufhören damit die lenticels geschlossen werden können.

Das Wachstum der Knollen tritt ein zum Ende der Laubreife.

Nach dem Roden sofort trocken belüften.

Kurze Keimruhe; Nach der Ernte und Wundheilung schnell kühlen und

Temperatur stabil halten und mit Keimhemmung anfangen.



### Lagerung:

4 °C

6 Monate

### Wichtige Ratschläge für den Erfolg dieser Sorte:

Pflanzgut vor Pflanzen ruhig halten und pflanzen Sie gleich aus Lager.

Pflanzkartoffeln nicht abkeimen.

Nicht anbauen auf Schorf anfälligen Boden.

Rechtzeitig Bewässerung aufhören damit die lenticels geschlossen werden können.

### Vermeiden Sie

**Abkeimen  
vor  
Pflanzen**

