

SOUND

MONDIAL x CMK2003-707-003



Building on potential

Mehrwert von Sorte

Trockenheitstolerante Sorte.
Sehr schöne Schalequalität.
Gibt hohe Erträge aus allen Bodentypen.
Sehr gut geeignet für Pommes Fritteusen zu Hause.

MEIJER 
POTATO



Eigenschaften

Knollenform	LO	
Knollenlänge Ø (50-60 mm)	9,1 cm	
Reifezeit (9=früh, 4=spät)	6,5	
Schalenfarbe	LY	
Fleischfarbe	7,0	
Speisequalität	7,4 B	

Bodenanpassungsfähigkeit

	Sandig	Leicht	Schwer
Ertrag (relativ)	118	128	121
DM (%)	18,6	20,3	20,7
UWG	338	373	380
Knollen Ø (mm)	52	58	61

Ro1	9	
Ro2/3	4	
Ro5	8	
Pa2	3	
Pa3	2	
wz 1 (D1)	9	
wz 2 (G1)	0	
wz 6 (O1)	4	
wz 18 (T1)	4	
TRV	6	
Moptop-Virus	ziemlich anfällig	

Klimaanpassungsfähigkeit

Trockenheitstoleranz	Ziemlich tolerant
Durchwuchs	7

Düngemittelbedarf

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Dosis	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Dosierungen #	1	1	1	6	1	1	1

Pflanzenschutz

Krautfäule	8
Knolle Krautfäule	ziemlich anfällig
Alternaria Knollenfäule	Tolerant
Y-Virus	
Yntn-virus	7
Blattrollenvirus	
Schwarzer Punkt	Ziemlich tolerant
Silberschorf	Tolerant
Metribuzin Vorauflauf	Anfällig
Metribuzin nach dem Auflaufen	Tolerant

Lagerfähigkeit

Keimruhe* (2 = kurz; 8 = lang)	7,1
Druckpunkte	Ziemlich tolerant
Fusarium	6
Verarbeitungsfarbe im Oktober*	6,3
Verarbeitungsfarbe im Februar*	5,8
verarbeitungsfarbe im Mai*	6,3

*Kartoffeln bei 8°C gelagert ohne Keimhemmungsmittel

Marktgängiger Ertrag

Blau/Schwarzfleckigkeit index (0-50)	22
Waschfähigkeit	7
Schorf	6
Puderschorf	6
% IRS	1
% HH	0
Äußere Beschädigungen	ziemlich anfällig



Pflanzen


Pflanzkartoffeln nicht mit Talent (Carvon) lagern, da dies die Keimung stoppt.
 In normaler Tiefe pflanzen.
 Zu viel Bewässerung führt zu einem geringeren marktfähigen Ertrag.

Sortierung	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	29 cm	24 cm	46800
35/45	35 cm	29 cm	38100
35/55	38 cm	32 cm	35100
45/55	39 cm	33 cm	34200
55/60	42 cm	35 cm	31700
60 +	43 cm	36 cm	31000



Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

Abhängig vom Bodenvorrat, und der nationalen Gesetzgebung.



Stickstoff (N)	200	--
Phosphat (P2O5)	110	110
Kali (K2O)	350	350

Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen (B, Mg, Mn, Ca)

Verwenden Sie kein Kaliumchlorid, um einen niedrigen Trockensubstanzgehalt zu vermeiden.



Ernteschutz

Anfällig für Metribuzin (volle Dosis) Vorauflauf.
 Phytophthora-Spritzen wie in der Praxis, mit einer vollen Dosis und einem normalen Intervall.



Ernte und Lagerung

Gut ausgereift roden.
 Vermeiden Sie mechanische Schale beschädigung während das roden.
 Sobald die Kartoffeln trocken sind Keimungsinhibitoren anwenden.
 Sound bei mindestens 8 °C Verladen/Sortieren/Verpacken, um Beschädigungen zu vermeiden.



Lagerung:

7 °C
 8 Monate

Wichtige Ratschläge für den Erfolg dieser Sorte:

Zu viel Bewässerung führt zu einem geringeren marktfähigen Ertrag.
 Verwenden Sie kein Kaliumchlorid, um einen niedrigen Trockensubstanzgehalt zu vermeiden.
 Sound bei mindestens 8 °C Verladen/Sortieren/Verpacken, um Beschädigungen zu vermeiden.

Nicht zu viel bewässern für eine gute Qualität

