

ACOUSTIC

ORCHESTRA x DOB1997-507-015



Building on potential

Toegevoegde waarde van het ras

Smaakvolle tafelaardappel met lage input.
Wasbare en mooie schil.
Hoge opbrengst op alle grondsoorten.
Tolerant voor klimaat stress.
Vroege knolzetting.

MEIJER
POTATO



Eigenschappen

Knolvorm	O	
Gem. knollengte (Ø 50-60 mm)	7,5 cm	
Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)	6,6	
Schilkleur	LY	
Vleeskleur	6,6	
Kookkwaliteit en kooktype	7,7 A	

Grond adaptatie

	Zand	Licht	Zwaar
Opbrengst (%)	104	103	100
Droge stof (%)	17,1	18,6	18,7
OWG	308	337	339
Knol (Ø mm)	56	61	64

Ro1	9	●
Ro2/3	6	●
Ro5	2	●
Pa2	1	●
Pa3	1	●
wz 1 (D1)	10	●
wz 2 (G1)	4	●
wz 6 (O1)	4	●
wz 18 (T1)	6	●
TRV	5	●
Moptop virus	Redelijk gevoelig	

Klimaat adaptatie

Droogte tolerantie	Tolerant
Doorwas	7 ●

Bemesting

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Hoogte van de gif	Laag (-25%)	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Aantal giften	1	1	1	1	1	1	1

Gewasbescherming

Phytophthora loof	9 ●
Phytophthora knol	Redelijk gevoelig
Alternaria	Redelijk tolerant
Y-virus	8 ●
Yntn-virus	10 ●
Bladrol virus	
Zwarte spikkel	Redelijk gevoelig
Zilverschorft	Redelijk gevoelig
Metribuzin voor opkomst	Gevoelig
Metribuzin na opkomst	Tolerant

Bewaarbaarheid

Kiemrust* (2=kort, 8=lang)	4,5	
Drukplekken	Redelijk gevoelig	
Fusarium	4 ●	
Bakkleur in oktober*	5,2 ●	
Bakkleur in februari*	4,7 ●	
Bakkleur in mei*	4,7 ●	

* Aardappels bewaard op 8°C zonder kiemremmingsmiddel

Vermarktbaarheid

Blauw index (0-50)	12 ●
Wasbaarheid	7 ●
Schorft	6 ●
Poederschorft	7 ●
% Interne gebreken	4 ●
% Hol	1 ●
Beschadigingen	Redelijk tolerant



Planten


- Plant het pootgoed zo snel mogelijk na ontvangst om kieming te voorkomen.
- Niet telen op schurft gevoelige gronden.
- Plant dieper en maak grote ruggen, om groene knollen te voorkomen.
- Poot in warme grond om aantasting door Rhizoctonia te voorkomen.
- Voer een behandeling uit tegen zwarte spikkel.

Maat	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/30	22 cm	18 cm	60600
30/40	28 cm	23 cm	47600
30/50	32 cm	27 cm	41700
40/50	36 cm	30 cm	37000
50/60	39 cm	33 cm	34200



Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



Stikstof:	(N)	180	--
Fosfaat:	(P2O5)	110	180
Kali:	(K2O)	250	110
			250

Om gebrek aan sporenelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, Ca).

Geef 25% minder stikstof dan een referentieras en geef alles aan de basis, rondom planten.



Gewasbescherming

- Gevoelig voor de volle dosering Metribuzin voor opkomst.
- Bescherm het gewas om de Phytophthora resistentie in het loof te behouden.
- Phytophthora bespuitingen als praktijk, met een volle dosering en een normaal interval.
- Zorg voor een goede knolbescherming aan het eind van het seizoen.



Oogst en opslag

- Goed laten afharden voor het rooien.
- Korte kiemrust: na wondheling snel terug koelen, de temperatuur stabiel houden en starten met kiemremming.
- Start met kiemremming zodra de aardappelen droog zijn.
- Gevoelig voor fusarium.



Bewaring:

3 °C
6 maanden

Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

- Pootgoed niet los laten komen, direct uit de koeling planten.
- Plant dieper en maak grote ruggen, om groene knollen te voorkomen.
- Geef 25% minder stikstof dan een referentieras en geef alles aan de basis, rondom planten.
- Goed laten afharden voor het rooien.
- Start met kiemremming zodra de aardappelen droog zijn.

Vermijd
kiemen
voor
het planten

