

JAZZY (0-40 mm)

FRANCELINE x CUPIDO



Building on potential

Toegevoegde waarde van het ras

- Excellente smaak, textuur en kookkwaliteit.
- Erg mooie schilkwaliteit.
- Ras met een erg hoog knolaantal.
- Ras geschikt voor het salade segment.
- Weinig gevoelig voor schurft.



Eigenschappen

Knolvorm	L	
Gem. knollengte (Ø 50-60 mm)	9,3 cm	
Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)	7,6	
Schilkleur	LY	
Vleeskleur	7,1	
Kookkwaliteit en kooktype	8 A	

Grond adaptatie

	Zand	Licht	Zwaar
Opbrengst (%)	55	67	67
Droge stof (%)	17,5	19,2	19,3
OWG	316	350	352
Knol (Ø mm)	36	36	40

Ro1	3	
Ro2/3		
Ro5		
Pa2		
Pa3		
wz 1 (D1)	10	
wz 2 (G1)	4	
wz 6 (O1)	4	
wz 18 (T1)	6	
TRV	7	
Moptop virus	Tolerant	

Klimaat adaptatie

Droogte tolerantie	Gevoelig
Doorwas	7

Bemesting

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Hoogte van de gif	Standaard	Hoog (+25%)	Laag (-25%)	Hoog (+25%)	Standaard	Standaard	Standaard
Aantal giften	1	1	1	4	1	1	1

Gewasbescherming

Phytophthora loof	3
Phytophthora knol	Gevoelig
Alternaria	Redelijk gevoelig
Y-virus	6
Yntn-virus	7
Bladrol virus	
Zwarte spikkel	Tolerant
Zilvereschurft	Tolerant
Metribuzin voor opkomst	Tolerant
Metribuzin na opkomst	Gevoelig

Bewaarbaarheid

Kiemrust* (2=kort, 8=lang)	2,0
Drukplekken	Redelijk gevoelig
Fusarium	4
Bakkleur in oktober*	4,2
Bakkleur in februari*	3,3
Bakkleur in mei*	3,3

* Aardappels bewaard op 8°C zonder kiemremmingsmiddel

Vermarktbaarheid

Blauw index (0-50)	5
Wasbaarheid	8
Schurft	7
Poederschurft	6
% Interne gebreken	0
% Hol	0
Beschadigingen	Redelijk tolerant

JAZZY (0-40 mm)



Planten

Pootgoed niet los laten komen, direct uit de koeling planten.

Plant op normale diepte.

Beddenteelt geeft meer baby productie.

Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.


Behandel de knollen tegen Rhizoctonia en zilverschurft.

Maat	75 cm	90 cm	Plant/ha
25/30	15 cm	13 cm	88900
30/40	20 cm	17 cm	66700
40/50	26 cm	22 cm	51300
30/50	00 cm	00 cm	
50/55	32 cm	27 cm	41700



Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



Stikstof:	(N)	150	--
Fosfaat:	(P2O5)	160	150
Kali:	(K2O)	250	160
			250

Om gebrek aan sporenelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, Ca).

Voor meer tal wordt Fosfaat in de rij aanbevolen.



Gewasbescherming

Gevoelig voor 150 g/ha Metribuzin na opkomst.

Gevoelig voor Phytophthora in het loof, wees alert.

Snelle knolgroei aan het eind van het seizoen, op tijd dood maken.



Oogst en opslag

Oogst zodra de aardappel velvast is, ca 18 dgn na loofdoding.

Korte kiemrust: na wondheling snel terug koelen,

de temperatuur stabiel houden en starten met kiemremming.

Start met kiemremming zodra de aardappelen droog zijn.



Bewaring:

2 °C

6 maanden

Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

Pootgoed niet los laten komen, direct uit de koeling planten.

Beddenteelt geeft meer baby productie.

Voor meer tal wordt Fosfaat in de rij aanbevolen.

Oogst zodra de aardappel velvast is, ca 18 dgn na loofdoding.

Houd de
bewaar-
temperatuur
stabiel

