

# JAZZY

FRANCELINE x CUPIDO



Building on potential

## Toegevoegde waarde van het ras

Excellente smaak, textuur en kookkwaliteit.  
Erg mooie schilkwaliteit.  
Ras met een erg hoog knolaantal.  
Dubbeldoelras: salade en kriel markt.  
Weinig gevoelig voor schurft.

**MEIJER**  
POTATO



## Eigenschappen

Knolvorm	L	
Gem. knollengte (Ø 50-60 mm)	9,3 cm	
Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)	7,6	
Schilkleur	LY	
Vleeskleur	7,1	
Kookkwaliteit en kooktype	8 A	

## Grond adaptatie

	Zand	Licht	Zwaar
Opbrengst (%)	55	67	67
Droge stof (%)	17,5	19,2	19,3
OWG	316	350	352
Knol (Ø mm)	36	36	40

Ro1	3	
Ro2/3		
Ro5		
Pa2		
Pa3		
wz 1 (D1)	10	
wz 2 (G1)	4	
wz 6 (O1)	4	
wz 18 (T1)	6	
TRV	7	
Moptop virus	Tolerant	

## Klimaat adaptatie

Droogte tolerantie	Gevoelig
Doorwas	7

## Bemesting

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Hoogte van de gif	Standaard	Hoog (+25%)	Laag (-25%)	Hoog (+25%)	Standaard	Standaard	Standaard
Aantal giften	1	1	1	6	1	1	1

## Gewasbescherming

Phytophthora loof	3
Phytophthora knol	Gevoelig
Alternaria	Redelijk gevoelig
Y-virus	6
Yntn-virus	7
Bladrol virus	
Zwarte spikkel	Tolerant
Zilvereschurft	Tolerant
Metribuzin voor opkomst	Tolerant
Metribuzin na opkomst	Gevoelig

## Bewaarbaarheid

Kiemrust* (2=kort, 8=lang)	2,0
Drukplekken	Redelijk gevoelig
Fusarium	4
Bakkleur in oktober*	4,2
Bakkleur in februari*	3,3
Bakkleur in mei*	3,3

\* Aardappels bewaard op 8°C zonder kiemremmingsmiddel

## Vermarktbaarheid

Blauw index (0-50)	5
Wasbaarheid	8
Schurft	7
Poederschurft	6
% Interne gebreken	0
% Hol	0
Beschadigingen	Redelijk tolerant



## Planten


Pootgoed niet los laten komen, direct uit de koeling planten.  
Plant op normale diepte.  
Poot in warme grond om aantasting door Rhizoctonia te voorkomen.  
Behandel de knollen tegen Rhizoctonia en zilverschurft.

Maat	75 cm	90 cm	Plant/ha
25/30	19 cm	16 cm	70200
30/40	25 cm	21 cm	53300
40/50	33 cm	28 cm	40400
30/50	29 cm	24 cm	46000
50/55	40 cm	33 cm	33300



## Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



Stikstof:	(N)	150	25	--	175
Fosfaat:	(P2O5)	110			110
Kali:	(K2O)	300			300

Om gebrek aan sporenelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, Ca).

Voor meer tal wordt Fosfaat in de rij aanbevolen.



## Gewasbescherming

Gevoelig voor 150 g/ha Metribuzin na opkomst.  
Gevoelig voor Phytophthora in het loof, wees alert.  
Snelle knolgroei aan het eind van het seizoen, op tijd dood maken.



## Oogst en opslag

Oogst zodra de aardappel velvast is, ca 18 dgn na loofdoding.  
Korte kiemrust: na wondheling snel terug koelen,  
de temperatuur stabiel houden en starten met kiemremming.  
Start met kiemremming zodra de aardappelen droog zijn.



### Bewaring:

2 °C  
6 maanden

### Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

Pootgoed niet los laten komen, direct uit de koeling planten.  
Voor meer tal wordt Fosfaat in de rij aanbevolen.  
Oogst zodra de aardappel velvast is, ca 18 dgn na loofdoding.  
Korte kiemrust: na wondheling snel terug koelen,  
de temperatuur stabiel houden en starten met kiemremming.

Houd de  
bewaar-  
temperatuur  
stabiel

