

LADY ANNA

CMK1993-042-005 x FONTANE







Building on potential

Toegevoegde waarde van het ras

Excellente bakkleur gedurende de bewaarperiode.
Uniforme sortering met een hoge vermarktbare opbrengst.
Volledige ABCD resistentie (Ro1,2,3 and Pa2).
Lange kiemrust, geschikt voor lange bewaring.
Erg homogene droge stof verdeling in de knol.
Erg goede bruto/netto verhouding voor de teler en de fabriek.



Eigenschappen

Knolvorm	L	
Gem. knollengte (Ø 50-60 mm)	10,0 cm	
Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)	6,6	
Schilkleur	Y	
Vleeskleur	6,9	
Kookkwaliteit en kooktype	8 B	

A B C D

Grond adaptatie

	Zand	Licht	Zwaar
Opbrengst (%)	89	90	86
Droge stof (%)	21,3	23,1	23,2
OWG	392	429	432
Knol (Ø mm)	47	52	57

Ro1	9	
Ro2/3	8	
Ro5	3	
Pa2	8	
Pa3	2	
wz 1 (D1)	10	
wz 2 (G1)	4	
wz 6 (O1)	4	
wz 18 (T1)	4	
TRV	7	
Moptop virus	Tolerant	

Klimaat adaptatie

Droogte tolerantie	Redelijk gevoelig
Doorwas	7


Bemesting

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Hoogte van de gif	Hoog (+25%)	Standaard	Standaard	Hoog (+25%)	Standaard	Standaard	Standaard
Aantal giften	3	1	1	6	1	1	1

Gewasbescherming

Phytophthora loof	4
Phytophthora knol	Gevoelig
Alternaria	Redelijk gevoelig
Y-virus	7
Yntn-virus	7
Bladrol virus	
Zwarte spikkel	Tolerant
Zilverschorft	Tolerant
Metribuzin voor opkomst	Tolerant
Metribuzin na opkomst	Tolerant

Bewaarbaarheid

Kiemrust* (2=kort, 8=lang)	5,9 
Drukplekken	Redelijk tolerant
Fusarium	7
Bakkleur in oktober*	7,4
Bakkleur in februari*	6,6
Bakkleur in mei*	5,9

* Aardappels bewaard op 8°C zonder kiemremmingsmiddel

Vermarktbare opbrengst

Blauw index (0-50)	8
Wasbaarheid	7
Schorft	7
Poederschorft	9
% Interne gebreken	1
% Hol	0
Beschadigingen	Redelijk gevoelig

LADY ANNA



Planten


Niet vroeg planten in koude grond, maar bij $> 8^{\circ}\text{C}$.
Pootgoed goed los laten komen voor het planten.
Kiemen niet mechanisch of chemisch beschadigen.
Er is een risico op inwendige gebreken op zandgrond.
Ondiep planten.

Maat	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	33 cm	28 cm	40400
35/45	40 cm	33 cm	33300
45/50	42 cm	35 cm	31700
50/60	44 cm	37 cm	30300
50/60 CUT	39 cm	33 cm	34200



Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



Stikstof:	(N)	200	50	25	275
Fosfaat:	(P2O5)	110			110
Kali:	(K2O)	300			300

Om gebrek aan sporenelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, Ca).

Een gedeelde N-gift is nodig voor een goede opbrengst.



Gewasbescherming

Gevoelig voor Phytophthora in het loof, wees alert.
Gevoelig voor Alternaria, start de Alternariabestrijding op tijd.



Oogst en opslag

Wacht tot de moederknollen weg zijn voor de oogst.
Na rooien zo snel mogelijk drogen.
Ethyleen in de bewaring kan de bakkwaliteit van dit ras beïnvloeden.



Bewaring:

6 °C
8 maanden

Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

Niet vroeg planten in koude grond, maar bij $> 8^{\circ}\text{C}$.
Pootgoed goed los laten komen voor het planten.
Kiemen niet mechanisch of chemisch beschadigen.
Wacht tot de moederknollen weg zijn voor de oogst.
Na rooien zo snel mogelijk drogen.

Vermijd
kiemen
voor
het planten

