

LADY ROSETTA


CARDINAL x (VTN)262-33-3







Building on potential

Toegevoegde waarde van het ras

Het vroegste chips ras op de markt.
Kan groen gerooid worden.
Ras met hoog onderwatergewicht.
Goede opbrengst in het vroege en midden segment.



Eigenschappen

Knolvorm	R
Gem. knollengte (Ø 50-60 mm)	6,5 cm
Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)	6,7 
Schilkleur	DR 
Vleeskleur	6,3 
Kookkwaliteit en kooktype	

A B C D

Grond adaptatie

	Zand	Licht	Zwaar
Opbrengst (%)	70	87	77
Droge stof (%)	24,1	24,7	24,8
OWG	449	460	463
Knol (Ø mm)	51	60	62

Ro1	9	
Ro2/3		
Ro5		
Pa2	2	
Pa3	2	
wz 1 (D1)	9	
wz 2 (G1)		
wz 6 (O1)	7	
wz 18 (T1)		
TRV	8	
Moptop virus		Gevoelig

Klimaat adaptatie

Droogte tolerantie	Redelijk tolerant
Doorwas	7


Bemesting

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Hoogte van de gif	Standaard	Standaard	Hoog (+25%)	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Aantal giften	1	1	1	6	1	1	1

Gewasbescherming

Phytophthora loof	3
Phytophthora knol	Gevoelig
Alternaria	Tolerant
Y-virus	8
Yntn-virus	7
Bladrol virus	Gevoelig
Zwarte spikkel	Redelijk tolerant
Zilverschorft	Gevoelig
Metribuzin voor opkomst	Tolerant
Metribuzin na opkomst	Tolerant

Bewaarbaarheid

Kiemrust* (2=kort, 8=lang)	4,2 
Drukplekken	
Fusarium	7
Bakkleur in oktober*	6,6
Bakkleur in februari*	5,6
Bakkleur in mei*	4,2

* Aardappels bewaard op 8°C zonder kiemremmingsmiddel

Vermarktbare opbrengst

Blauw index (0-50)	38
Wasbaarheid	5
Schorft	7
Poederschorft	8
% Interne gebreken	2
% Hol	1
Beschadigingen	Gevoelig

LADY ROSETTA



Planten


Door voor te kiemen kan 10 dgn eerder gerooid worden.
Behandel de knollen tegen Rhizoctonia en zilverschurft.

Maat	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	19 cm	16 cm	70200
35/50	27 cm	23 cm	49400
50/60	39 cm	33 cm	34200
35/55	29 cm	24 cm	46000
55/60	40 cm	33 cm	33300
60 +	41 cm	34 cm	32500



Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



Stikstof:	(N)	220	--	220
Fosfaat:	(P2O5)	110		110
Kali:	(K2O)	230	100	330

Om gebrek aan sporenelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, Ca).

Geef een K-gift vlak voor planten en rond knolzetting.
Geef een gedeelde K-gift om blauw te beperken.



Gewasbescherming

Gevoelig voor Phytophthora in het loof, wees alert.
Tijdig beginnen met Phytophthora bestrijding.



Oogst en opslag

Blauwgevoelig: voorzichtig rooien.
Na rooien zo snel mogelijk drogen.
Dit ras is niet geschikt voor de lange bewaring.



Bewaring:

8 °C
4 maanden

Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

Geef een K-gift vlak voor planten en rond knolzetting.
Geef een gedeelde K-gift om blauw te beperken.
Gevoelig voor Phytophthora in het loof, wees alert.
Blauwgevoelig: voorzichtig rooien.

Oogst onder goede
omstandigheden
voorkom
blauw

