

# SOUND

MONDIAL x CMK2003-707-003



Building on potential





## Toegevoegde waarde van het ras

Droogte resistent ras.  
Erg mooie schilkwaliteit.  
Hoge opbrengst op alle grondsoorten.  
Erg bruikbaar voor thuisfriet.

**MEIJER**   
**POTATO**










## Eigenschappen

Knolvorm	LO	
Gem. knollengte (Ø 50-60 mm)	9,1 cm	
Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)	6,5	
Schilkleur	LY	
Vleeskleur	7,0	
Kookkwaliteit en kooktype	7,4 B	

A B C D

## Grond adaptatie

	Zand	Licht	Zwaar
Opbrengst (%)	118	128	121
Droge stof (%)	18,6	20,3	20,7
OWG	338	373	380
Knol (Ø mm)	52	58	61

Ro1	9	
Ro2/3	4	
Ro5	8	
Pa2	3	
Pa3	2	
wz 1 (D1)	9	
wz 2 (G1)	0	
wz 6 (O1)	4	
wz 18 (T1)	4	
TRV	6	
Moptop virus	Redelijk gevoelig	




## Klimaat adaptatie

Droogte tolerantie	Redelijk tolerant
Doorwas	7 






## Bemesting

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Hoogte van de gif	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Aantal giften	1	1	1	6	1	1	1

## Gewasbescherming







Phytophthora loof	8 
Phytophthora knol	Redelijk gevoelig
Alternaria	Tolerant
Y-virus	
Yntn-virus	7 
Bladrol virus	
Zwarte spikkel	Redelijk tolerant
Zilvereschurft	Tolerant
Metribuzin voor opkomst	Gevoelig
Metribuzin na opkomst	Tolerant

## Bewaarbaarheid

Kiemrust* (2=kort, 8=lang)	7,1 
Drukplekken	Redelijk tolerant
Fusarium	6 
Bakkleur in oktober*	6,3 
Bakkleur in februari*	5,8 
Bakkleur in mei*	6,3 

\* Aardappels bewaard op 8°C zonder kiemremmingsmiddel

## Vermarktbare opbrengst

Blauw index (0-50)	22 
Wasbaarheid	7 
Schurft	6 
Poederschurft	6 
% Interne gebreken	1 
% Hol	0 
Beschadigingen	Redelijk gevoelig



## Planten


Bewaar het pootgoed niet in Talent: negatief effect op kieming.  
Plant op normale diepte.  
Teveel beregening kan leiden tot een lagere vermarktbare opbrengst.

Maat	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	29 cm	24 cm	46800
35/45	35 cm	29 cm	38100
35/55	38 cm	32 cm	35100
45/55	39 cm	33 cm	34200
55/60	42 cm	35 cm	31700
60 +	43 cm	36 cm	31000



## Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



Stikstof:	(N)	200	--
Fosfaat:	(P2O5)	110	200
Kali:	(K2O)	350	110
			350

Om gebrek aan sporenelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, Ca).

Gebruik geen Chloorkali om te laag onderwatergewicht te voorkomen.



## Gewasbescherming

Gevoelig voor de volle dosering Metribuzin voor opkomst.  
Phytophthora bespuitingen als praktijk, met een volle dosering en een normaal interval.



## Oogst en opslag

Goed laten afharden voor het rooien.  
Pas op voor rooibeschatiging.  
Start met kiemremming zodra de aardappelen droog zijn.  
Sound verladen/sorteren/verpakken bij minimaal 8°C om beschadiging te voorkomen.



### Bewaring:

7 °C  
8 maanden

### Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

Teveel beregening kan leiden tot een lagere vermarktbare opbrengst.  
Gebruik geen Chloorkali om te laag onderwatergewicht te voorkomen.  
Sound verladen/sorteren/verpakken bij minimaal 8°C om beschadiging te voorkomen.

Bereggen  
niet te veel  
voor goede  
kwaliteit

