

# LADY CLAIRE

AGRIA x KW78-34-470

**MEIJER**  
POTATO



Building on potential

## Toegevoegde waarde van het ras

Goede chips kwaliteit na lange bewaring.  
Uniforme sortering in de maat.  
Weinig blauwgevoelig.  
Hoge en homogene verwerkingskwaliteit.

## Eigenschappen

Knolvorm	RO	
Gem. knollengte (Ø 50-60 mm)	7,3 cm	
Rijptijd (9=vroeg, 4=laat)	7,6	
Schilkleur	DY	
Vleeskleur	7,1	
Kookkwaliteit en kooktype	8 BC	

## Geschiktheid voor alle grondsoorten

	Zand	Licht	Zwaar
Opbrengst (%)	59	65	66
Droge stof (%)	21,0	23,5	23,2
OWG	386	438	430
Knol (Ø mm)	45	51	56

Ro1	9	
Ro2/3		
Ro5		
Pa2		
Pa3		
wz 1 (D1)	10	
wz 2 (G1)		
wz 6 (O1)	8	
wz 18 (T1)		
TRV	7	
Moptop virus	Tolerant	

## Klimaat adaptiviteit

Droogte tolerantie	Gevoelig
Doorwas	7

## Bemesting

	N	P	K	Mg	B	Ca	Mn
Hoogte van de gif	Hoog (+25%)	Standaard	Hoog (+25%)	Hoog (+25%)	Standaard	Standaard	Hoog (+25%)
Aantal giften	2	1	2	8	1	1	6

## Gewasbescherming

Phytophthora loof	3
Phytophthora knol	Gevoelig
Alternaria	Gevoelig
Y-virus	6
Yntn-virus	7
Bladrol virus	Tolerant
Zwarte spikkel	Tolerant
Zilverscurft	Tolerant
Metribuzin voor opkomst	Gevoelig
Metribuzin na opkomst	Tolerant

## Bewaarbaarheid

Kiemrust* (2=kort, 8=lang)	6,3
Drukplekken	Gevoelig
Fusarium	8
Bakkleur in oktober*	7,8
Bakkleur in februari*	7,8
Bakkleur in mei*	7,1

\* Aardappels bewaard op 8°C zonder kiemremmingsmiddel

## Vermarktbaar opbrengst

Blauw index (0-50)	11
Wasbaarheid	6
Scurft	7
Poederscurft	8
% Interne gebreken	1
% Hol	0
Beschadigingen	Tolerant



## Planten


Pootgoed niet los laten komen, direct uit de koeling planten.  
 Poot in warme grond om aantasting door Rhizoctonia te voorkomen.  
 Plant op normale diepte.  
 Geschikt voor sterk mineraliserende gronden.  
 Alleen op beregende percelen.

Maat	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/35	21 cm	18 cm	63500
35/55	33 cm	28 cm	40400
30/40	30 cm	25 cm	44400
40/50	35 cm	29 cm	38100
50/60	38 cm	32 cm	35100
60 +	40 cm	33 cm	33300



## Bemestingsadvies (kg/ha):

Afhankelijk van bodemvoorraad en regelgeving. De totale behoefte van het ras:



Stikstof:	(N)	175	50	25	250
Fosfaat:	(P2O5)	110			110
Kali:	(K2O)	250	100		350

Om gebrek aan sporelementen te voorkomen, tijdig toedienen (B, Mg, Mn, Ca).

Een gedeelde N-gift is nodig voor een goede opbrengst.  
 Geef een K-gift vlak voor planten en rond knolzetting.



## Gewasbescherming

Gevoelig voor de volle dosering Metribuzin voor opkomst.  
 Gevoelig voor Phytophthora in het loof, wees alert.  
 Gevoelig voor Alternaria, start de Alternariabestrijding op tijd.  
 Regelmatige Magnesium bemesting helpt de plant gezond te houden.



## Oogst en opslag

Korte kiemrust: na wondheling snel terug koelen,  
 de temperatuur stabiel houden en starten met kiemremming.  
 Start met kiemremming zodra de aardappelen droog zijn.

**Bewaring:**  
 6 °C  
 9 maanden

### Belangrijkste adviezen voor een goed resultaat:

Alleen op beregende percelen.  
 Een gedeelde N-gift is nodig voor een goede opbrengst.  
 Geef een K-gift vlak voor planten en rond knolzetting.  
 Gevoelig voor Alternaria, start de Alternariabestrijding op tijd.  
 Start met kiemremming zodra de aardappelen droog zijn.

Gedeelde  
 kunstmestgift  
 geeft hogere  
 opbrengst

